

LES HEMOCULTURES

INDICATIONS (non exhaustif)

- Hyperthermie $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$, frissons, hypothermie $< 36^{\circ}\text{C}$.
- Fièvre prolongée chez des patients porteurs de matériel (sonde urinaire, KT central, prothèse orthopédique, chambre implantable, valve cardiaque, ...).
- Hémoculture de contrôle dans certaines situations (Bactériémie à Staphylocoque, infection de cathéter...).

MODALITES

1. Cas général

Réalisation de 3 Paires sur le même prélèvement veineux, en cas de capital veineux altéré il est possible de ne réaliser que 2 paires d'hémoculture.

2. Suspicion d'endocardite

Réalisation de 3 paires sur le même prélèvement veineux, puis une paire 2 heures après puis 2 paires le lendemain. Continuer avec 2 paires le lendemain si fièvre, frissons toujours présents.

3. Patient porteur de cathéter (périphérique ou central) sans autre point d'appel évident

Réalisation de 2 paires sur veine périphérique et 2 paires sur le cathéter suspecté : Différencier les flacons selon leur provenance et à réaliser impérativement au même moment afin de pouvoir interpréter un différentiel de pousse.

4. Hémoculture de Contrôle

Réalisation d'une paire sur veine périphérique et / ou sur cathéter. Dans ce cas une seule paire est suffisante.

- Voir Document : *Bonnes pratiques de prélèvement des flacons d'hémoculture.*