

Utilisation des C3G orales

Céfixime et Cefpodoxime

En tant que C3G utilisables par voie orale, ces molécules peuvent sembler une bonne option en ville et en EHPAD. Cependant, du fait **de faibles concentrations sériques et tissulaires**, associées à un risque de **sélection de souches sécrétrices de bêtalactamases**, leurs indications sont très limitées **et le plus souvent en deuxième intention**.



NON INDICATIONS

- **Traitement probabiliste des IU chez l'adulte.**
- **Traitement documenté d'une IU à Entérobactérie sans résistance particulière.**
- **Traitement documenté d'une IU masculine (mauvaise diffusion prostatique).**
- **Infection ORL en l'absence d'allergie aux pénicillines.**
- **Infection pulmonaire (hors exacerbation de BPCO avec allergie aux pénicillines).**
- **Infection dentaire.**



INDICATIONS

Céfixime OROKEN®

- **Traitement probabiliste d'une pyélonéphrite chez l'enfant de plus de 3 mois, uniquement si fièvre récente, état général conservé, sans antécédent d'infection urinaire ni d'antibiothérapie récente.**
- **Traitement documenté d'une IU féminine de bonne évolution en cas de résistance ou contre-indication à amoxicilline, amoxicilline-acide clavulanique, cotrimoxazole et fluroquinolone.**

Cefpodoxime ORELOX®

Uniquement en cas d'allergie aux pénicillines, dans les situations suivantes :

- **Angine à Streptocoque A.**
- **Otite Moyenne Aigue.**
- **Sinusite maxillaire aiguë.**
- **Exacerbation de BPCO.**

Les C3G orales, comme les quinolones et l'amoxicilline-acide clavulanique font partie de la liste des antibiotiques critiques de l'ANSM car particulièrement générateurs de résistances bactériennes.