

Colonisation urinaire

=

Présence de micro-organismes dans les urines sans manifestation clinique qu'il existe ou non une bactériurie/candidurie ou une leucocyturie associée.

Une colonisation urinaire ne doit pas être traitée par antibiotique (Hors grossesse ou chirurgie urologique prévue).

POPULATION	PREVALENCE DE LA COLONISATION URINAIRE
FEMMES < 50 ANS	1 - 5%
FEMMES ENTRE 50 ET 70 ANS	2,8 - 9,6%
PATIENTS DIABETIQUES	Femme : 9 - 27% Homme : 0,7 - 11%
PATIENTS DE PLUS DE 70 ANS VIVANTS AU DOMICILE	Femme : 10,8 - 16% Homme : 3,6 - 19%
PATIENTS VIVANTS EN INSTITUTION	Femme : 25 - 50% Homme : 15 - 40%
PATIENTS AVEC LÉSIONS MÉDULLAIRES	23 - 89%
PATIENTS HEMODIALYSÉS	28%
PATIENTS AVEC SONDE URINAIRE OU MATERIEL ENDO-URETERAL OU URETEROSTOMIE	Provisoire : 3-5% par jour de sondage Long terme : 100%

Sources :

- Recommandations pour la prise en charge des infections urinaires communautaires de l'adulte, SPILF 2018
- Clinical Practice Guidelines for the management of Asymptomatic Bacteriuria, 2019 update by the Infectious Diseases Society of America

Janvier 2025